

# Wenn der Kopf spu(c)kt

Migräne ist eine komplexe neurologische Erkrankung. Betroffene leiden unter anfallsartigen, oftmals einseitigen, pulsierenden starken Kopfschmerzen, die häufig von Symptomen wie Übelkeit und Erbrechen begleitet werden.

## Gute Frage



**PTA Pia Schön, langjährige PTA in einer großen Apotheke, hat es im Apothekenalltag häufig mit Fragen wie diesen zu tun.**

# 1

Mein Kunde leidet regelmäßig unter Migräne. In letzter Zeit kam immer häufiger Übelkeit, gefolgt von Erbrechen hinzu. Das führt dazu, dass er das eingenommene Triptan meist wieder erbrochen hat. Wäre hier der Einsatz eines Antiemetikums, wie z. B. Vomex A<sup>®</sup>, nicht sinnvoll?

Für mehr Infos scannen Sie den QR-Code



Vomex A<sup>®</sup> Dragees 50mg, überzogene Tabl.; Wirkst.: Dimenhydrinat. Zusammensetzung: 1Dragee enthält 50mg Dimenhydrinat. Sonst. Bestandt.: Mikrokrist. Cellulose, Lactose-Monohydrat, Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), hochdisp. Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Hypromellose, arabisches Gummi, Hyprollose, Talkum, Sucrose, Macrogol 6000, Calciumcarbonat, Titandioxid, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H<sub>2</sub>O, Eisen(III)-oxid, Carminsäure-Aluminiumsalze, Carnaubawachs, Bienenwachs. Anwendungsgebiet: Zur Prophylaxe u. symptomatischen Therapie v. Übelkeit u. Erbrechen unterschiedl. Genese, insbes. v. Kinetosen. Für Kinder ab 6 Jahren u. über 30 kg Körpergewicht, Jugendliche u. Erwachsene. Hinweis: Dimenhydrinat ist zur alleinigen Behandlung v. Zytostatika-induzierter Übelkeit u. Erbrechen nicht geeignet. Gegenanz.: Überempfindlichkeit gegen d. Wirkstoff, andere Antihistaminika od. einen d. sonst. Bestandt., akuter Asthma-Anfall, Engwinkelglaukom, Phäochromozytom, Porphyrie, Prostatahyperplasie mit Restharnbildung, Krampfanfällen (Epilepsie, Eklampsie), Herzrhythmusstörungen (z. B. Wolff-Parkinson-White Syndrom). Nicht anzuwenden bei einem Körpergewicht unter 6 kg. Nebenw.: Sehr häufig: Somnolenz; Kopfschmerzen; Benommenheit. Häufig: Sedierung; Mydriasis; Tachykardie; Verstopfte Nase; Mundtrockenheit; Muskuläre Schwäche; Störungen bei d. Harnblasenentleerung. Gelegentlich: Eingeschränktes Erinnerungsvermögen; Gleichgewichtsstörung; Schwindelgefühl; Aufmerksamkeits-/Koordinationsstörung; Verwirrheitszustand; Halluzination; Stimmungsschwankungen; Schlaflosigkeit; Vertigo; Myasthenie; Erhöhter Intraokulärer Druck. Selten: Urticaria; Ödem; Anaphylaktische Reaktionen; Angst; vermind. Sehschärfe; Orthostasesyndrom; Unruhe; Agitiertheit; Nervosität; Tremor; Obstipation; Erythem; Ekzem; Angioödem; Purpura; Allergische Dermatitis. Sehr selten: Leuko-, Neutro-, Thrombozytopenie; Hämolyt. Anämie; Extrapyramidale Erkrankung. Häufigkeit nicht bekannt: Gastrointestinale Erkrankungen; Hepatische Funktionsstörungen; Photosensibilität; QT-Intervall-Verlängerung im EKG. Pädiatrische Patienten: Möglichkeit d. Auftretens paradoxer Reaktionen wie Unruhe, Erregung, Schlaflosigkeit, Angstzustände od. Zittern. Ältere Patienten: Gelegentliches Auftreten v. Gleichgewichtsstörungen, Verwirrung, Schwindel, Gedächtnis- oder Konzentrationsstörungen werden häufiger beobachtet. Warnhinw.: Enthält Lactose, Sucrose (Zucker). Weitere Hinw.: s. Fachinformation. Apothekenpflichtig. Stand: 12/20-1. Klinge Pharma GmbH, 83607 Holzkirchen, Deutschland.

## Gute Antwort

**Die Fachapothekerin Nadine Stampff kennt das Problem und hat Patienten, die mit der gleichen Symptomatik zu kämpfen haben, bereits mehrfach erfolgreich beraten.**



Für viele Migräne-Patienten gehört genau diese Situation zu ihren regelmäßigen Migräne-Attacken dazu: 80 Prozent von ihnen leiden an Übelkeit, 40 bis 50 Prozent so stark, dass sie sich erbrechen müssen.<sup>1</sup> Das führt oftmals dazu, dass die Schmerzmedikation erbrochen wird und die Attacke daher länger anhält und heftiger ist, als es ohne Erbrechen der Fall gewesen wäre. Das Verhindern von Erbrechen durch ein Antiemetikum wie Vomex A<sup>®</sup> ermöglicht eine effektive Wirkung von Schmerzmitteln. Bei den ersten Anzeichen einer Migräne-Attacke eingenommen, wirkt Vomex A<sup>®</sup> bereits nach etwa 30 Minuten. Erst dann sollte die Schmerzmedikation folgen. Mein Extra-Tipp: Da Migräne gerne auch mal auf Reisen auftritt, gehört Vomex A<sup>®</sup> in jede Reiseapotheke.



**KLINGE  
PHARMA**