

Der Beratungs Booster

Was verschafft schnelle Linderung bei Sodbrennen? Talcid® Kautabletten und Liquid bieten gleich zwei Vorteile: Die Magensäure wird kontrolliert neutralisiert und die natürlichen Schutzmechanismen der Magen- und Speiseröhrenschleimhaut aktiviert.^{1,2}

1.



Für wen geeignet?

Talcid® kann Kund*innen ab 12 Jahren empfohlen werden, die über Sodbrennen und säurebedingte Magenbeschwerden klagen.

2.



Was ist enthalten?

Talcid® ist ein Antazidum mit dem Wirkstoff Hydrotalcit, der aus gitterförmigen Schichten besteht, die durch elektrostatische Kräfte zusammenhalten. Eine Schicht besteht aus Aluminium-Magnesium-Hydroxid, die andere aus Carbonat-Ionen und Wasser.

3.



Wie wirkt Talcid®?

Hydrotalcit reguliert die Übersäuerung des Magens kontrolliert: Ist der therapeutisch optimale pH-Wert von etwa 4,5 erreicht, wird vorerst kein Wirkstoff mehr gelöst. Fällt der pH-Wert wieder ab, reagiert der Wirkstoff erneut.

4.



Darum empfehlen!

- Intelligentes Wirkprinzip: reguliert die Magensäure kontrolliert und nur dann, wenn zu viel Säure vorhanden ist
- Mageninhalt wird nicht basisch, sondern bleibt im therapeutisch optimalen pH-Bereich
- lindert Sodbrennen und Magendruck
- schützt die Schleimhaut von Magen und Speiseröhre

Talcid®



Dosierung

Pro Anwendung
1-2 Kautabletten/
1 Beutel*

Abgabertipp und Hinweise

- Talcid® Kautabletten lösen sich beim Kauen rasch und krümellos auf.
- Talcid® Liquid ist perfekt für die Einnahme unterwegs.
- Talcid® kann die Aufnahme anderer Medikamente beeinträchtigen, daher sollte ein Einnahmeabstand von 1-2 Stunden eingehalten werden.

Für mehr Infos den QR-Code scannen



Pflichttext zur rechten Seite 39 / Anzeige Talcid - Bayer

Talcid® Kautabletten, Talcid® Liquid. Wirkstoff: Hydrotalcit. **Zusammensetzung:** 1 Kautablette Talcid enthält: 500 mg Hydrotalcit. Sonstige Bestandteile: Mannitol, Maisstärke, Magnesiumstearat, Saccharin-Natrium, Pfefferminz-Aroma (enthält Menthol), Bananen-Aroma. 10 ml Talcid Liquid (1 Beutel Suspension) enthalten: 1000 mg Hydrotalcit. Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Carmellose-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid, Bentonit, Zimtöl, Saccharin-Natrium, Aromastoff. **Anwendungsgebiete:** Zur symptomatischen Behandlung von Erkrankungen, bei denen die Magensäure gebunden werden soll: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre (Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni); Sodbrennen und säurebedingte Magenbeschwerden. **Gegenanzeigen:** Allergie gegen Hydrotalcit oder einen der sonstigen Bestandteile. Schwere Nierenfunktionsstörungen, Myasthenia gravis und Hypophosphatämie. Bei eingeschränkter Nierenfunktion nur unter ärztlicher Kontrolle des Serumspiegels von Magnesium und Aluminium. **Nebenwirkungen:** **Immunsystem:** Allergische Reaktionen möglich. **Magen-Darm-Trakt:** Bei hoher Dosierung kann es zu Verstopfung, breiigem Stuhl, erhöhter Stuhlfrequenz bis hin zu Durchfall und Erbrechen kommen. **Nieren und Harnwege:** Bei stark eingeschränkter Nierenfunktion kann Talcid Hypermagnesiämie und Anstieg der Serum-Aluminiumspiegel verursachen; bei Niereninsuffizienz und bei langfristiger Einnahme hoher Dosen kann es zur Aluminiumeinlagerung vor allem in das Nerven- und Knochengewebe und zur Phosphatverarmung kommen. Häufigkeiten: nicht bekannt. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Siehe Fachinformation. **Hinweis:** nur Kautabletten: Enthält Pfefferminz-Aroma. **Stand der Information:** 10/2024. Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland.

*Die maximale Menge beträgt 12 Kautabletten bzw. 3 Beutel am Tag und sollte nicht überschritten werden.

¹In-vitro-Untersuchungen: Tarnawski A et al. Curr Pharm Des. 2013;19:126-132; 2 In-vitro-Untersuchungen: Tarnawski A et al. Gastroenterology. 2012;142 (5) Suppl 1:S-202.