

Der Beratungs Booster

Ihre kompetente Beratung in der Apotheke steigert die Chance, langfristig rauchfrei zu werden, um 70 Prozent.¹ Zusätzlich kann eine Nikotinersatztherapie, z. B. mit dem nicorette® Pflaster, bei einem erfolgreichen Rauchstopp unterstützen.²



1.

Für wen geeignet?

Das nicorette® Pflaster ist in unterschiedlichen Wirkstärken erhältlich und eignet sich vor allem für Raucher:innen, die über den Tag einen stabilen Nikotinspiegel benötigen. Zudem kann es bei Bedarf in kritischen Momenten, z. B. bei Stresssituationen, mit oralen Darreichungsformen kombiniert werden.

2.



Was ist enthalten?

nicorette® Pflaster sind mit 10, 15 und 25 mg Nikotin sowie in den Packungsgrößen mit 7, 14 und 21 Stück erhältlich. Ein Pflaster ersetzt den Tagesbedarf an Zigaretten – so erleichtert schon eine kleine Packung die erste rauchfreie Woche, in der das Rückfallrisiko beim Rauchstopp am größten ist!

3.



Wie wirkt das nicorette® Pflaster?

Das transdermale Pflaster gibt über 16 Stunden kontinuierlich Nikotin über die Haut ab, mildert so den ganzen Tag Entzugssymptome wie Unruhe, Reizbarkeit oder starkes Rauchverlangen und erleichtert somit den Rauchstopp. Ohne nächtliche Nikotinzufuhr, die den Schlaf stören kann.*

4.

Darum empfehlen!

- ▲ Besonders unauffällig: halbtransparent sowie kleiner und dünner als andere Nikotinpflaster³
- ▲ Kontinuierliche Nikotinabgabe über den Tag und einfache Anwendung
- ▲ 16-Stunden-Tragedauer respektiert den natürlichen Wach-Schlaf-Rhythmus*
- ▲ Pflaster als Basis für die Kombinationstherapie mit oralen Darreichungsformen

nicorette® Transdermales Pflaster

Tageshöchst dosis

Abgabebetipp und Hinweise

Pflichttext zur Anzeige nicorette® auf der nebenstehenden Seite



1 Pflaster tägl.

- ▲ 25 mg: Einstieg (> 20 Zig. tgl.)
- ▲ 15 mg: Einstieg (≤ 20 Zig. tgl.) oder 2. Phase (bei 25 mg zuvor)
- ▲ 10 mg: letzte Phase der Entwöhnung

Für mehr Infos den QR-Code scannen und am Webinar teilnehmen.



Pflichttext

Nicorette® TX Pflaster 10 mg, 15 mg, 25 mg

Wirkstoff: Nicotin. **Zusammensetzung:** Arzneil. wirks. Bestandt.: 1 Nicorette TX Pflaster 10 mg / 15 mg / 25 mg mit 9 cm² / 13,5 cm² / 22,5 cm² Adsorptionsfläche enth.: 15,8 mg Nicotin (1,75 mg/cm²) / 23,6 mg Nicotin (1,75 mg/cm²) / 39,4 mg Nicotin (1,75 mg/cm²). Durchschnittliche Wirkstofffreigabe: 10 mg/16 Stunden / 15 mg/16 Stunden / 25 mg/16 Stunden. **Sonst. Bestandt.:** Mittelkettige Triglyceride, Basisches Butylmethacrylat-Copolymer (Ph. Eur.), Poly(acrylsäure-co-butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinyl-acetat) (5:15:75:5), Kaliumhydroxid, Croscarmellose-Natrium, Aluminiumtris(acetylacetonat), Abdeckschicht u. abziehbare Schutzfolie: Poly(ethylenterephthalat)-Film. **Anwendungsgebiete:** Behandl. d. Tabakabhängigkeit durch Linderung d. Entzugssympt. Unterstützung d. Raucherentwöhnung. Bei Erw. **Gegenanzeigen:** Nichtraucher, Gelegenheitsraucher; Überempfindlichk. geg. Wirkstoff od. sonst. Bestandt. **Nebenwirkungen:** Dosisabh. ähnliche NW wie b. Rauchen als auch Sympt. d. Entzuges mögl.: Dysphorie od. depressive Verstimmung, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Frustration od. Zorn, Angst, Konzentrationsstör., Ruhelosigkeit od. Ungeduld; Vermind. Herzfrequenz, gesteigerter Appetit od. Gewichtszunahme, Schwindel, präsynkopale Sympt., Husten, Obstipation, Zahnfleischbluten, Mundgeschwüre u. Nasopharyngitis. Nicotinverlangen m. Drang zum Rauchen. NW zumeist zu Behandlungsbeginn auftretend u. dosisabh. Leichte lokale Hautreakt. wie z. B. Pruritus, Exantheme u. Hautreizungen währ. d. ersten Behandlungswochen (20 % d. Behandelten). Pat., d. überempfindlich auf Heftpflaster reagieren, sollten sorgfältig auf d. Auftreten v. Hauterscheinungen achten. NW aus klin. Studien u. seit Markteinführung: **Sehr häufig:** Pruritus. **Häufig:** Kopfschmerzen, Schwindel; **Übelk.,** Erbrechen; Hautausschlag, Urtikaria. **Gelegentlich:** **Überempfindlichk.;** Abnorme Träume; Parästhesie; Palpitationen, Tachykardie; Hitzewallung, Hypertension; Dyspnö; Hyperhidrose; Myalgie (in d. Nähe / im Umfeld d. Pflasters); Beschw. am Verabreichungsort, Asthenie, Beschw. u. Schmerzen im Brustbereich, Malaise, Erschöpfung. **Nicht bekannt:** Anaphylaktische Reakt.; Krampfanfälle (beobachtet b. Pat., d. Antikonvulsiva einnehmen od. b. denen in d. Vergangenheit Epilepsie auftrat); gastrointest. Beschw. (in d. Nähe / im Umfeld d. Pflasters); Angioödem, Erythem; Schmerzen in d. Extremitäten. Kenvue Germany GmbH, 41470 Neuss. Stand: 05/2025

* bei Patient:innen, die auf Nikotinverabreichung während des Schlafs mit Schlafstörungen reagieren.

¹ vs. kein persönlicher Kontakt, Fiore et al., Am J Prev Med 2008; 35:158-176; ²Theodoulou A, et al.; Cochrane Database of Systematic Reviews 2023; Issue 6. Art. No.: CD013308; ³Vergleich nicorette® TX Pflaster mit anderen in Deutschland erhältlichen Nikotinpflastern vergleichbarer Wirkstärke