

Nachgefragt



BERATUNG ZU VAGINALMYKOSEN

H Hintergrund

Zu den typischen Symptomen einer Vaginalmykose mit dem Hefepilz *Candida albicans* zählen Juckreiz, Brennen oder Rötungen im Intimbereich. Häufig werden die Beschwerden von vermehrtem, krümelig weißem Ausfluss begleitet, der typischerweise nach Hefe riecht. Weil das betroffenen Frauen unangenehm ist und sie belastet, suchen sie in der Apotheke schnelle und effektive Lösungen. Für die Selbstmedikation von Scheidenpilzinfektionen stehen Arzneimittel mit dem Antimykotikum Clotrimazol zur Verfügung. Dr. Kade, seit 25 Jahren Markt-




Abb.: entzündete Vaginalhaut bei einer Vaginalmykose

führerin im Antimykotika-Markt,¹ bietet mit KadeFungin® 3 Kombi-Packung Vaginaltabletten und eine hoch dosierte Vaginalcreme an. Damit lässt sich meist innerhalb von 3 Tagen die Pilzinfektion sowohl

in der Scheide als auch im äußeren Genitalbereich behandeln. Eine Studie zeigt, dass solch eine kombinierte Therapie sogar wirksamer sein kann als eine intravaginale Therapie allein.²

W Wirkstoffe



KadeFungin® 3 Kombi-Packung enthält 3 Vaginaltabletten mit Clotrimazol (je 200 mg) sowie eine Tube hoch dosierter Vaginalcreme (20 g, 2 %). Das Breitbandantimykotikum Clotrimazol gehört zur Gruppe der Imidazole. Unter anderem wirkt es gegen den Hefepilz *Candida albicans*, einem der häufigsten Auslöser von Scheidenpilzinfektionen. Da bei einer Scheidenpilzinfektion oft auch der äußere Genitalbereich befallen ist und Reinfektionen begünstigt, ist es für eine erfolgreiche Behandlung wichtig, Vagina und den äußeren Genitalbereich (Klitoris, Vulvalippen, Scheidenausgang, Damm) bis zum After hin zu behandeln.

W Wirkweise

Clotrimazol hemmt die Pilz-Ergosterol-Synthese, wodurch sich die Dichtigkeit der Pilzzellmembran verringert. In Folge verliert die Pilzzelle für sie wichtige Zellbestandteile, vermehrt sich nicht mehr und stirbt letztlich ab. Zusätzlich wirkt Clotrimazol antientzündlich, was Begleitsymptome von Scheidenpilzinfektionen lindert. Die Vaginaltabletten werden an 3 aufeinanderfolgenden Tagen abends in die Scheide eingeführt. Nach Kontakt mit Vaginalsekret lösen sie sich unter leichter Schaumbildung auf und Clotrimazol verteilt sich gleichmäßig in der Vagina. Bei der begleitend auf die äußeren Genitalien aufzutragenden Clotrimazol-Creme reicht im Unterschied zu Kombipräparaten mit niedriger dosierten Cremes eine dreitägige Behandlung aus. Nachcremen darüber hinaus ist nicht nötig.

KadeFungin® 3 Kombi-Packung

- ist seit 25 Jahren Marktführerin im Antimykotika-Markt¹
- behandelt innerhalb von 3 Tagen effektiv Scheidenpilzinfektionen
- enthält das bewährte Breitbandantimykotikum Clotrimazol
- umfasst 3 Vaginaltabletten (200 mg) und hoch dosierte Creme (2 %)

B Beratung



Hinterfragen Sie die Eigendiagnose Vaginalpilz. Berichtet eine Kundin über fischig riechenden Ausfluss, sollte zum Ausschluss einer bakteriellen Infektion eine gynäkologische Praxis aufgesucht werden. Das Gleiche gilt für erstmalig auftretende Scheidenpilzinfekte. Hatte eine Kundin bereits eine vaginale Candidose und leidet erneut unter krümelig-weißem Ausfluss gepaart mit Juckreiz und Brennen, können Sie KadeFungin® 3 Kombi-Packung empfehlen. Die Vaginaltabletten werden mit dem beiliegenden Applikator abends vor

dem Schlafengehen tief in die Scheide eingeführt. Im Unterschied zu Vaginalzäpfchen hinterlassen sie keine Fettbestandteile in der Unterwäsche und benötigen keine besonderen Lagerungsbedingungen. Machen Sie Kundinnen klar, dass es wichtig ist, die Creme begleitend dreimal täglich anzuwenden. Denn das verstärkt die Effektivität der Therapie. Nach Rücksprache mit dem Arzt können auch Schwangere KadeFungin® 3 Kombi-Packung verwenden. Sie sollten die Tabletten mit dem Finger einführen.



Digitale Fortbildung für den Apothekenalltag

Die aKADEmie setzt auf kurze Lerneinheiten, die zeitlich flexibel zur Verfügung stehen und sich so gut in den Apothekenalltag integrieren lassen. Neben den Schulungen finden sich praxisnahe Produktinformationen, Wissenswertes über verschie-

dene Indikationen sowie hilfreiche Tipps für ein empathisches Kundengespräch. Einfach registrieren und los geht's! Das Lernangebot auf akademie.kade.de wird in regelmäßigen Abständen mit neuen interessanten Inhalten gefüllt.

KadeFungin® 3 Kombi-Packung, Vaginaltabletten und Creme

Wirkstoff: Clotrimazol. **Zus.:** 1 Vaginaltablette enth. 200 mg Clotrimazol. Sonst. Bestand.: Adipinsäure, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), vorverkleisterte Maisstärke, Natriumhydrogencarbonat, Polysorbat 80, hochdisperses Siliciumdioxid, Stearinsäure. 1 g Creme enth. 20 mg Clotrimazol. Sonst. Bestand.: Benzylalkohol, Cetylpalmitat (Ph. Eur.), Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Octyldodecanol (Ph. Eur.), Polysorbat 60, Sorbitanstearat, gereinigtes Wasser. **Anw.:** Infektionen der Scheide und des äußeren Genitalbereiches durch Hefepilze (meist *Candida albicans*). **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gg. Clotrimazol, Polysorbat, Benzylalkohol und Cetylstearylalkohol od. einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenw.:** Gelegentlich: lokale Hautreizungen (z. B. Rötungen, Brennen, Stechen); bei Überempfindlichkeit: allergische Reaktionen auf der Haut; vaginale Blutungen, Häufigkeit nicht bekannt. **Warnhinw.:** Die Creme enthält Benzylalkohol, Cetylstearylalkohol und Polysorbat. Die Vaginaltablette enthält Polysorbat. Packungsbeilage beachten. Stand: 12/2025 DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin

* Getestet wurden: Wirkstoffe: Wirksamkeit, Anwendung während der Schwangerschaft. Weitere Inhaltsstoffe: aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe, Silikone, synthetische Polymere. Verpackung: PVC/PVDC/chlorierte Verbindungen. Vollständigkeit und Qualität der Beipackzettelhinweise. ¹ Nach verkauften Packungen in Deutschland, IH-Galaxy Apo-Fusion MAT 02/2026. ² Mendling W, Schlegelmilch R. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74: 355–360.