

Erfolgreich im HV

KADEFUNGIN® 3

DIE 3-TAGESTHERAPIE BEI SCHEIDENPILZ

Beratung

Für die Selbstmedikation von Scheidenpilz stehen Arzneimittel mit dem Antimykotikum Clotrimazol zur Verfügung. KadeFungin® 3 Kombi-Packung vereint Vaginaltabletten mit einer hochdosierten Creme für die Vulva. So werden beide betroffenen Bereiche gleichzeitig behandelt. Die Anwendung ist in der Regel nach 3 Tagen abgeschlossen.

Juckt oder brennt es im Intimbereich und sind die Beschwerden von krümelig-weißem und nach Hefe reichendem Ausfluss begleitet, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Scheidenpilz (medizinisch: Vulvovaginalcandidose). Auslöser ist meist der Hefepilz *Candida albicans*. In der Selbstmedikation bewährt, haben sich Präparate mit Clotrimazol. Das Breitbandantimykotikum hemmt den Aufbau der Pilzzellmembran, indem es die Ergosterol-Synthese stört. Dadurch wird die Pilzzellmembran instabil. In Folge wächst die Pilzzelle nicht weiter und stirbt letztlich ab. Die KadeFungin® 3 Kombi-Packung enthält 3 Vaginaltabletten mit Clotrimazol (je 200 mg) sowie eine Tube hochdosierter Clotrimazol-Creme (20 mg in 1g Creme, 2 %). Eine Tablette wird vor dem Schlafengehen an

3 aufeinanderfolgenden Tagen mit dem beiliegenden Applikator (Schwangerschaft: per Finger!) in der Vagina platziert. Die Tablette enthält ein Brausesystem aus Adipinsäure und Natriumhydrogencarbonat. Wenig Vaginalsekret reicht daher aus, damit sich die Tablette auflöst und der Wirkstoff freigesetzt wird. Ein Zusatz von Milchsäure ist nicht notwendig. Diese ist auch bei einem Scheidenpilz natürlicherweise in der Vagina vorhanden. Bei der begleitend auf die äußeren Genitalien aufzutragenden Clotrimazol-Creme (3 x tgl. cremen) reicht im Unterschied zu Kombipräparaten mit niedriger dosierter Creme eine 3-tägige Behandlung aus. Nachcremen darüber hinaus ist nicht nötig. Eine Studie zeigt, dass solch eine kombinierte Therapie sogar wirksamer sein kann als eine alleinige vaginale Therapie.¹



Tipp

Schulungen, praxisnahe Produktinformationen, Wissenswertes über verschiedene Indikationen und Tipps fürs empathische Kundengespräch finden PTA auf der aKADEmie.

akademie.kade.de



Verkaufsargumente

KadeFungin® 3 Kombi-Packung behandelt Symptome wie Juckreiz und Brennen im Intimbereich bei Scheidenpilz.



Clotrimazol

in Form von KadeFungin® 3 Kombi-Packung wirkt gegen *Candida albicans*, den häufigsten Erreger des Scheidenpilzes.

1




Kurze Behandlungsdauer

Dank der hochdosierten 2%igen Clotrimazol-Creme in der KadeFungin® 3 Kombi-Packung dauert die gesamte Anwendung nur 3 Tage – für Vaginaltabletten und Creme gleichermaßen. Es sind keine besonderen Lagerungsbedingungen zu beachten.



2



Optimale Verteilung

Die Tablette wird per Applikator in der Vagina platziert. Der beim Auflösen entstehende Schaum kann die Verteilung des Wirkstoffs in der Vagina unterstützen, ohne einen fettigen Rückfluss zu hinterlassen.

3



Marktführerin seit 25 Jahren

Dr. Kade ist seit 25 Jahren Marktführerin² bei Scheidenpilz und bietet mit KadeFungin® 3

Kombi-Packung eine schnelle und effektive Behandlung von Scheidenpilz.

KadeFungin® 3

^{*} nach Rücksprache mit der Ärztin oder dem Arzt

¹ Mending W, Schlegelmilch R. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74: 355–360; ² nach verkauften Packungen in Deutschland, IH-Galaxy Apo-Fashion 05/2026

KadeFungin® 3 Kombi-Packung, Vaginaltabletten und Creme

Wirkstoff: Clotrimazol. **Zus.:** 1 Vaginaltablette enth. 200 mg Clotrimazol. Sonst. Bestandt.: Adipinsäure, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), vorverkleisterte Maisstärke, Natriumhydrogencarbonat, Polysorbat 80, hochdisperses Siliciumdioxid, Stearinsäure. 1 g Creme enth. 20 mg Clotrimazol. Sonst. Bestandt.: Benzylalkohol, Cetylpalmitat (Ph. Eur.), Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Octyldodecanol (Ph. Eur.), Polysorbat 60, Sorbitanstearat, gereinigtes Wasser. **Anw.:** Infektionen der Scheide und des äußeren Genitalbereiches durch Hefepilze (meist *Candida albicans*). **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gg. Clotrimazol, Polysorbat, Benzylalkohol und Cetylstearylalkohol od. einen der sonstigen Bestandteile **Nebenw.:** Gelegentlich: lokale Hautreizungen (z. B. Rötungen, Brennen, Stechen); bei Überempfindlichkeit: allergische Reaktionen auf der Haut; vaginale Blutungen, Häufigkeit nicht bekannt. **Warnhinw.:** Die Creme enthält Benzylalkohol, Cetylstearylalkohol und Polysorbat. Die Vaginaltablette enthält Polysorbat. Packungsbeilage beachten. Stand: 12/2025 DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin