

Schilddrüse

Den Fortbildungsbeitrag finden Sie auf Seite 20 ff.
Teilnahme bis 27.07.2027



1. Welcher Laborparameter ist bei einer primären Hypothyreose erhöht?

- A) *fT3*
- B) *TSH*
- C) *Thyreoglobulin*

2. Welcher Wirkstoff ist Mittel der ersten Wahl bei Hypothyreose?

- A) *Liothyronin*
- B) *Carbimazol*
- C) *Levothyroxin*

3. Welche Aussage zu L-Thyroxin ist korrekt?

- A) *Einnahme nüchtern, 30 Minuten vor dem Frühstück*
- B) *Einnahme vorzugsweise abends nach dem Essen*
- C) *Einnahme zusammen mit Milch*

4. Welche Substanz hemmt die Thyreoperoxidase?

- A) *Trijodthyronin*
- B) *Propylthiouracil*
- C) *radioaktives Jod*

5. Welche Nebenwirkung ist typisch für Thyreostatika?

- A) *Bradykardie*
- B) *Hyperkaliämie*
- C) *Agranulozytose*

6. Welche Konstellation spricht für eine Hyperthyreose?

- A) *TSH erniedrigt, fT3 und fT4 erhöht*
- B) *TSH erhöht, fT3 und fT4 erniedrigt*
- C) *TSH erhöht, fT3 und fT4 erhöht*

7. Welche Aussage zur Radiojodtherapie ist korrekt?

- A) *Sie ist bei Hyperthyreose kontraindiziert.*
- B) *Sie wirkt innerhalb von 24 Stunden.*
- C) *Sie zerstört Schilddrüsengewebe durch Strahlung.*

8. Welche Interaktion ist bei L-Thyroxin klinisch relevant?

- A) *erhöhte Absorption durch Mineralstoffe*
- B) *erniedrigte Absorption durch Eisenpräparate*
- C) *erhöhte Absorption durch Kaffee*

9. Welche der folgenden Aussagen ist richtig? T3 ...

- A) *hat eine längere Halbwertszeit als T4.*
- B) *wirkt langsamer, aber gleichmäßiger als T4.*
- C) *wirkt schneller und stärker als T4.*

10. Welche Aussage zu T3 vs. T4 trifft zu?

- A) *T3 ist die Standardtherapie bei Hypothyreose.*
- B) *T3 wird gegenüber T4 in der Schwangerschaft bevorzugt, weil es effektiver wirkt.*
- C) *T4 wird gegenüber T3 bevorzugt, weil es stabile Wirkspiegel ermöglicht.*



◀ Hier geht es zum Online-Fragebogen.