Zertifizierte Fortbildung

das-pta-magazin.de/fortbildung

pta-point
Fortbildungspunkte /// DAS PTA MAGAZIN
www.das-pta-magazin.de

Laxanzien

Den Fortbildungsbeitrag finden Sie auf Seite 20ff.
Teilnahme bis 26.11.2027



1. Welche Aussage trifft zu?
A) Beim obstipationsdominierten Reizdarmsyndrom (RDS-O) können Laxanzien eingesetzt werden.
B) Beim RDS-O dürfen Laxanzien wegen der Gefahr von Elektrolytstörungen nicht angewendet werden.
C) Prulacoprid ist ein verschreibungspflichtiges Laxans, das bei RDS-O auch schmerzlindernd wirkt.

2. Welche Aussage trifft nicht zu?
A) Die Gabe von Flohsamenschalen kann Obstipationssymptome lindern.
B) Wer mehr Ballaststoffe aufnehmen möchte, muss auch die Flüssigkeitszufuhr erhöhen.
C) Durch die Erhöhung der Trinkmenge kann eine Verstopfung wirksam bekämpft werden.

3. In welchem Bereich liegt die normale Stuhlfrequenz eines Erwachsenen?
A) ein- bis dreimal täglich bis dreimal pro Woche
B) zwei- bis dreimal pro Woche
C) maximal einmal täglich

4. Auf welchem Prinzip beruht die Wirksamkeit von Lactulose bei hepatischer Enzephalopathie?
A) Bindung von Ammoniak im Darm
B) Spaltung von Ammoniak in NO und H2O
C) Bakterielle Vergärung von Ammoniak

5. Welcher Wirkstoff gehört bei Obstipation in der Schwangerschaft nicht zur ersten Wahl?
A) Lactulose
B) Bisacodyl
C) Macrogol

◀ Hier geht es zum Online-Fragebogen.

6. Auf welchem Prinzip beruht die Wirkung von Naloxegol?
A) Bindung an Serotoninrezeptoren im Darm
B) Bindung an μ-Opioidrezeptoren im Darm
C) reflektorische Stimulation der Defäkation

7. Wie heißt die laxierend wirkende Verbindung in Rizinusöl?
A) Ricin
B) Ricinin
C) Ricinolsäure

8. Bei welchem Laxans kann eine harmlose Rot- bis Rotbraun-Färbung des Urins auftreten?
A) Lactulose
B) Natriumpicosulfat
C) Sennesblätterextrakt

9. Ein schlanker Kunde berichtet, dass er seit einer Woche keinen Stuhlgang hatte, dennoch zwei Kilogramm Gewicht verloren hat und unter Bauchkrämpfen leidet. Sie empfehlen …
A) Bisacodyl-Zäpfchen zur raschen Stuhlentleerung und ein Präparat mit Butylscopolaminiumbromid gegen die Krämpfe.
B) einen umgehenden Besuch beim Hausarzt, der diese Beschwerden abklären sollte.
C) Flohsamenschalen gegen die Verstopfung in Kombination mit Bauchmassage zur Linderung der Krämpfe.

10. Eine Kundin möchte für ein bis zwei Wochen Bisacodyl-Dragees einnehmen und fragt, ob die Antibabypille dann noch sicher ist. Welche Empfehlung ist ungeeignet?
A) Bei Anwendung von Laxanzien bestehen keine Bedenken bezüglich der Sicherheit von oralen Kontrazeptiva.
B) Vorsichtshalber kann die Kundin in diesem Zeitraum noch eine weitere Verhütungsmaßnahme wie Kondome anwenden.
C) Wenn die Pille mittags und Bisacodyl abends, mit einem Abstand von mehr als vier Stunden zum Kontrazeptivum, eingenommen wird, bestehen keine Bedenken.

Foto: Alexey Avdeev, Getty Images/iStockphoto; Montage: DAV/DAS PTA MAGAZIN